



# Kiehl-Desisan concentré

## Nettoyant désinfectant liquide exempt d'acide

### Tests et référencements

#### SANTÉ - Recommandations de dosage pour la désinfection de surfaces

Méthode de test	Spectre d'efficacité	Charge	Dosage		Temps de contact	Germes-tests
EN 16615 / Essai à 4 zones Recommandation d'application certifiée VAH (Association allemande pour l'hygiène appliquée) pour la désinfection de surfaces avec action mécanique	bactéricide / levuricide	élevée	6 %	30 ml/500 ml	5 min	Staphylococcus aureus dont SARM, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Virus modifié de la vaccine Ankara (MVA)
EN 16777 Essai quantitatif de surface	virucide contre les virus enveloppés					

#### Autres tests

Méthode de test	Spectre d'efficacité	Charge	Dosage		Temps de contact	Germes-tests
EN 13727 Essai quantitatif de suspension	bactéricide	élevée	2,5 %	30 ml/1,2 L	5 min	Staphylococcus aureus dont SARM, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 13624 Essai quantitatif de suspension	levuricide	élevée	2,5 %	30 ml/1,2 L	5 min	Candida albicans
<b>Virucidie</b>						
EN 14476 Essai quantitatif de suspension	virucide contre les virus enveloppés	élevée	6 %	30 ml/500 ml	5 min	Virus modifié de la vaccine Ankara (MVA)
DVV/RKI Essai quantitatif de suspension	virucide contre les virus enveloppés	avec et sans	6 %	30 ml/500 ml	5 min	BVDV (substitut pour HCV), virus de la vaccine
		sans	6 %	30 ml/500 ml	5 min	Rotavirus

Voir aussi [www.desinfektionsmittelliste.de](http://www.desinfektionsmittelliste.de)